



Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnicos
Administrativos
Edital 63/2013

Chave de Correção da Prova Discursiva

Cargo: NS-13 - Médico - Obstetra

Questão 1
Citar 5 das opções abaixo: <ul style="list-style-type: none">- antibióticos (para aumentar o tempo de latência)- administrar corticoide (para amadurecimento pulmonar)- profilaxia para GBS (para evitar a sepse neonatal)- MgSO₄ (para neuroproteção fetal)- CTG e/ou USG (para avaliar vitalidade fetal)- Leucograma e proteína C reativa / avaliar sinais clínicos de infecção (rastreamento de quadro infeccioso)
Questão 2
Citar 5 das opções abaixo: <ul style="list-style-type: none">- Manobra de McRoberts: flexão e abdução das coxas em direção ao abdome materno.- Pressão suprapúbica: empurrar o ombro fetal para baixo e para o lado de modo a empurrar o a empurrá-lo em direção ao tórax fetal.- Manobra de Rubin II: inserir os dedos atrás do ombro anterior, tentando rodá-lo em direção ao tórax fetal.- Manobra de saca-rolha de Woods: colocar a mão atrás do ombro fetal posterior, tentando rodá-lo 180°.- Extração do braço posterior: o cotovelo fetal é flexionado e o antebraço é liberado em movimento de varredura sobre a parede anterior do tórax fetal. A mão é segurada e o braço estendido ao longo da face fetal, liberando-a da vagina. Isso encurta o diâmetro biacromial e permite que o feto caia na concavidade sacra, liberando o ombro anterior impactado.- Manobra da posição de 4: nessa posição ocorre o desencavamento do ombro anterior.- Clidotomia: fratura deliberada da clavícula anterior- Manobra de Zavanelli: recolocação da cabeça fetal no útero, seguida de cesárea.- Sinfisiotomia: secção da cartilagem fibrosa da sínfise púbica.
Questão 3
Citar 5 das opções abaixo: <ul style="list-style-type: none">- Misoprostol- Método de Krause- Dinoprostona- Dilatadores osmóticos (laminárias)- Descolamento de membranas- Hialuronidase
Questão 4
Sinais de alerta: <ul style="list-style-type: none">- dor abdominal intensa e contínua- vômito persistente

- hipotensão postural e/ou lipotimia
- sonolência
- agitação ou irritabilidade
- hepatomegalia ou fígado doloroso à palpação
- sangramento de mucosa
- hemorragias importantes
- diminuição da diurese
- aumento repentino do hematócrito
- queda abrupta das plaquetas

Exames:

- hemograma com plaquetas
- radiografia de tórax ou ultrassonografia de tórax (avaliar derrame pleural)
- ultrassonografia abdominal (avaliar hepatomegalia e ascite)
- provas de função hepática
- uréia e creatinina
- ultrassonografia obstétrica

Questão 5

Citar pelo menos cinco das condutas abaixo:

- se disponível, interná-la em unidade de tratamento intensivo
- oxigênio
- cateterismo venoso e vesical (controle horário da diurese)
- avaliação laboratorial (TAP, PTT, fibrinogênio, hemograma com plaquetas)
- hidralazina parenteral
- sulfato de magnésio
- interrupção da gestação 4 horas após a estabilização da paciente